

Nowotwór jelita cienkiego

data aktualizacji: 2019.02.06 autor:



- opowiada Dariusz Jastrzębski, lekarz gastrolog z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

Rak jelita cienkiego to najrzadziej diagnozowany nowotwór układu pokarmowego. Ze względu na rzadkość występowania, a także na niecharakterystyczne objawy i lokalizację, która utrudnia badanie, rak ten jest zwykle diagnozowany dopiero w zaawansowanym stadium rozwoju. To niestety znacznie zmniejsza rokowania chorych.

Nie ustalono jednoznacznych czynników wpływających na powstanie nowotworów jelita cienkiego. Do najczęściej wymienianych czynników ryzyka zalicza się palenie tytoniu i picie alkoholu. Na nowotwory jelita cienkiego zapadają częściej osoby, u których stwierdza się występowanie innych chorób przewodu pokarmowego, m. in. chorobę trzewną, chorobę Leśniowskiego-Crohna, błędy dietetyczne, zatrucia, zakażenia drobnoustrojami, pasożyty przewodu pokarmowego i choroby zapalne o immunologicznym podłożu.

Na raka jelita cienkiego składa się zespół objawów takich jak: niedokrwistość, krwawienie do przewodu pokarmowego, biegunka, bóle brzucha. Dopiero w zaawansowanym stadium rozwoju może

pojawić się tzw. „ostry brzuch”, czyli zespół szybko rozwijających się objawów: wymioty, zatrzymanie gazów i bardzo silne bóle brzucha.

Na rozwój raka jelita cienkiego najbardziej są narażone osoby między 50. a 60. rokiem życia.

Wysłuchała Joanna Młynarczyk

Źródło: <https://eglos.pl/aktualnosci/item/30656-nowotwor-jelita-cienkiego>